ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Дефибрилятор внешний Saver One

Автоматический портативный дефибриллятор (АВД) с голосовыми подсказками серии SaverOne



SAVER ONE - Автоматический портативный дефибриллятор (АВД) с голосовыми подсказками.

SAVER ONE разработан для оказания первой помощи при жизнеугрожающих аритмиях, а также внезапной остановке сердца в общественных местах: в офисах, отелях, школах, фитнес-центрах, спортивных клубах, стоматологических кабинетах, в аэропортах, на автобусных и железнодорожных станциях, поездах различного назначения, дискотеках, ночных клубах, пляжах.

Простой интуитивный интерфейс, понятные и спокойные голосовые подсказки, четкие инструкции позволяют провести эффективные реанимационные мероприятий даже неподготовленному человеку. **Дефибриллятор Saver One** всегда готов к использованию и проводит несколько тестирований в сутки в автоматическом режиме. Готовность к работе медицинского прибора отражается LED индикацией. Срок службы в режиме ожидания 4 года.

Ранняя дефибрилляция при остановке сердца – залог успеха реанимационных мероприятий

Возникновение тяжелой аритмии и внезапная остановка сердца является одной из самых распространённых причиной смерти в Европе. Ежегодно лишь в одной Европе у полумиллиона людей возникает остановка сердца или аритмия, которая несовместима с жизнью. Среди пострадавших регистрируется высокий процент смертности - лишь 1 пациент из 5 выживает. Простые приемы реанимации уменьшают летальность в два раза, а это означает 100 000 спасенных жизней ежегодно.

Европейский совет по реанимации разработал четкий порядок реанимационных мероприятий под названием **«Цепь Спасения»**:

1. Распознание критической ситуации (отсутствие пульса на магистральных сосудах (сонной и бедренной артериях, отсутствие дыхания), позвонить в службу спасения
2. Ранее начало сердечно-легочной реанимации (30 компрессий на 2 вдоха ров-в-рот) в ожидании проведения дефибрилляции.
3. Дефибрилляция при помощи **АВД (автоматического внешнего дефибриллятора)**
4. Ранее начало интенсивной терапии

Как показывают последние статистические исследования, одной сердечно-легочной реанимации недостаточно, эти мероприятия лишь увеличивает эффективность дефибрилляции. Использование АВД увеличивает выживаемость при жизненно угрожающей аритмии и внезапной остановке сердца в несколько раз. Дефибрилляция в течение 3-5 минут обеспечивает выживаемость на уровене 40-70%

Автоматические внешние дефибрилляторы рекомендуют использовать для оказания первой помощи при жизнеугрожающей аритмии и внезапной остановке сердца Ассоциацией Кардиологов США (American Heart Association (AHA)) и Европейским Советом по Реанимации (European Resuscitation Council (ERC))