ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

ROTEM delta

Современный 4-х канальный тромбоэластометр с блоком (опция) для агрегации тромбоцитов.



Тромбоэластометр ROTEM delta – современный 4-х канальный тромбоэластометр с блоком (опция) для агрегации тромбоцитов.

Быстрая дифференциальная диагностика является жизненно важной. Она также является основой целенаправленной терапии. Тестирование с помощью ROTEM delta и портфеля жидких реагентов обеспечивает быструю диагностику коагулопатий для оптимизации решений по переливанию крови при операциях и сценариях травматического кровотечения. Обзор состояния коагуляции в течение 10 минут помогает мгновенно определить лежащую в основе коагулопатию и принять соответствующие решения для индивидуальной и целенаправленной терапии.

С системами ROTEM сокращаются объемы переливания крови, повторные операции, показатели инфицирования, расходы, связанные с продолжительностью пребывания в больнице и смертность пациентов.

Комплексный портфель реагентов обеспечивает дифференциальную диагностику и позволяет получить результат уже через 10 минут.

- ex-tem 10 x 1 мл – реагент для исследования активации по внешнему пути
- in-tem 10 x 1 мл – реагент для исследования активации по внутреннему пути
- ap-tem 10 x 1 мл – реагент для детекции гиперфибринолиза и оценки эффективности антифибринолитической терапии.
- fib-tem 10 x 1 мл – реагент для исследования фибриногена с блокировкой тромбоцитов, детекция нарушений полимеризации фибрина. Воздействие FXIII.
- hep-tem 10 x 1+1 x 1 мл – детекция гепарина (и аналогичных антикоагулянтов), детекция нарушений гемостаза на фоне антикоагулянтной терапии

Измеряемые параметры

- **CT** (время коагуляции) – общая активность коагуляционной системы
- **CFT** (время образования сгустка) и альфа-угол (начальная скорость образования сгустка) – оценка функции тромбоцитов, действия фактора XIII, полимеризации фибрина, активности гепарина

- **MCF** – качество сгустка, оценка его механических свойств
- **ML** – оценка фибринолитической активности